

THÔNG BÁO
Về việc phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa Xuân

Kính gửi: Các đồng chí trưởng thôn

Căn cứ kết quả điều tra định kỳ và bổ sung từ ngày 22/4 - 25/4/2024, trên cây lúa giai đoạn lúa đẻ nhánh, với diễn biến thời tiết nắng nóng xen âm u, có mưa rào như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật hại phát sinh, phát triển gây hại. Đối tượng sinh vật hại chủ yếu sau:

1. Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy gây hại nhẹ cục bộ, mật độ trung bình 20 – 50 con/m², cao 200 - 400 con/m²;

2. Sâu quắn lá nhỏ Bướm vũ hóa mật độ trung bình 1,0-2,0 c/m², cao 5,0 - 7,0 c/m²; sâu non gây hại cục bộ, mật độ trung bình 4,0 - 6,0 c/m², nơi cao 8,0-10,0 c/m². Phổ biến sâu tuổi 2 - 3.

3. Bệnh vàng lá lúa do nghệt rễ: Phát sinh cục bộ ở một số ít diện tích lúa xuân diện tích khoảng 0,5ha .

* **Dự báo:** Rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu quắn lá nhỏ bệnh vàng lá lúa tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại Lúa Xuân.

Để phòng trừ rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu quắn lá, bệnh vàng lá lúa kịp thời, hiệu quả UBND xã Cai Kinh đề nghị các đồng chí trưởng thôn tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thăm đồng thường xuyên phát hiện sớm sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ sau:

*** Biện pháp phòng trừ:**

Rầy nâu, rầy lưng trắng: Mật độ rầy từ 750 con/m² (18 con/ khóm), sử dụng một trong các loại thuốc như: Basa 50EC, Sét 565EC, LED 70WG nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, phun 20 - 30 lít nước thuốc đã pha cho 1 sào. Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

Sâu quắn lá nhỏ - Dùng đèn bẫy để tiêu diệt bướm, kết hợp diệt bướm sâu đục thân, thời gian đặt đèn từ 18,0 giờ tối đến 6,0 giờ sáng hôm sau.

- Ruộng có mật độ sâu non từ 10 con/m² (0,3 con/khóm) tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật.

- Theo dõi chặt chẽ sự biến động của bướm, bướm vũ hóa rộ sau 5-7 ngày hoặc sâu non nở rộ tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật. Phun nhắc lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày.

Sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật như: Emacarb 85EC, Aka 47 Éch chúa... phun khi sâu còn tuổi nhỏ. Nồng độ theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm. Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

Bệnh vàng lá lúa với những ruộng đã bị khô nên bón đạm hoặc NPK, lúa chớm bị bệnh có thể dùng một số phân bón qua lá như: Atonic, Com cat, Neoamistagold450SC, ... phun theo hướng dẫn trên bao bì. Sau khi phun thuốc 2 – 3 ngày tháo cạn nước rắc vôi bột kết hợp sục bùn để ruộng khô từ 5 đến 7 ngày sau đó cho nước vào ruộng, nếu ruộng bị bệnh nặng phải phun lại lần 2.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Dân